

Conditions d'emploi et parcours de soins : recherche des singularités hommes femmes face aux souffrances mentales

Cynthia MORGNY, directrice
Observatoire régional de la santé de Bourgogne Franche-Comté



Objectifs

Mettre en relation et comparer des données sur les trajectoires et organisations d'emploi et les trajectoires de soins des hommes et des femmes, déclarant des problèmes de santé mentale au travail

⇒ A partir de 2 approches complémentaires

- Un volet quantitatif
- Un volet qualitatif



Etape quantitative

Échantillon source mobilisé

à partir de l'enquête CT-RPS 2016 appariée aux données du SNDS

⇒ Individus actifs occupés ayant répondu à la partie auto-administrée

**Sélection de
l'échantillon d'étude**

Questionnaire MINI
CT-RPS 2016

Personnes ayant déclaré un épisode dépressif majeur (EDM) ou un trouble anxieux généralisé (TAG)

ET/OU

Cartographie des pathologies
(Cat. 5/6) SNDS


Personnes prises en charge pour maladies psychiatriques et/ou consommant des psychotropes



Quelques résultats

Échantillon d'étude :

- 44 % identifiés exclusivement à partir d'un EDM et/ou un TAG
- 41 % pris en charge en soins exclusivement pour un trouble psychique *via* le SNDS
- 15 % présentant un EDM et/ou TAG ET pris en charge en soins pour un trouble psychique *via* le SNDS





Quelques résultats d'étude

- 15 % : déclarent des troubles psychiques au travail **et** ont recours à des soins du fait de ces troubles.
- 73 % : suivis pour des problèmes de santé mentale, identifiés dans le SNDS, **ne déclarent pas de troubles au travail.**
- 25 % : déclarent un épisode dépressif majeur ou un trouble anxieux généralisé **au travail et consomment des soins pris en charge par l'Assurance maladie.**





Le genre : un effet variable

- **Le risque d'appartenir à l'échantillon EDM TAG** : + important pour les hommes soumis à un facteur de risque psychosocial par rapport à leurs homologues sans risque, que pour les femmes dans le même cas ;
- **Des écarts moindres entre hommes et femmes** du côté du risque d'appartenir à l'échantillon PbSM SNDS.
- **Devoir prendre des risques pour sa santé physique et mentale** : un effet plus marqué chez les femmes



Quelques résultats

- Une typologie en 4 groupes





Etape qualitative

- 30 entretiens semi-directifs : AS, AMP, Infirmiers, 15 hommes et 15 femmes, entre 24 et 60 ans
- Abordant : le contexte de déclaration d'une souffrance mentale, émergence et causes de la ou des souffrances, réactions et ressources mobilisées par les personnes



Le genre du métier

- Invisibilise les souffrances vécues
- travail lié au **care majoritairement féminin** ;
naturalisation des savoirs et des compétences
comme dispositions personnelles
- **dépasse le genre individuel** : identité
professionnelle genrée
- **Prolonge le temps d'expositions** à des
risques avant un arrêt qui apparaît le recours
« ultime »



Métier genré et genre du métier entre professionnels et managers

- Confusion qui limite l'expression et la reconnaissance des compétences pensées comme « naturelles »
- Pour les AS et infirmiers(-ières), un fort sentiment d'appartenance à un collectif de travail qui pèse sur la mise en retrait et le soin
- Le travail émotionnel est un travail

The background features several thick, diagonal, rounded rectangular bars in various colors including yellow, light blue, orange, green, red, and purple. Interspersed among these bars are small, solid-colored circles in shades of blue, orange, and purple.

Merci de votre attention